Анкета о поведении пациентов с новой коронавирусной инфекцией (источником инфекции)*

Идентификатор регистрации NESID:

Имя пациента:

☆(Общее) обследование поведения перед началом заболевания проводится примерно за 14 дней до начала заболевания с целью оценки источника инфекции. Опросите пациента, чтобы получить информацию об истории его поведения в местах с высоким риском заражения*, а также истории его к онтактов с людьми с симптомами (беседа с глазу на глаз и т. д.). К местам с повышенным риском заражения относятся рабочие места, школы, медиц инские учреждения, учреждения социальной защиты и другие места массового скопления людей, а также закрытые помещения, в которых в течение о пределенного периода времени контактирует друг с другом неопределенное количество людей.

Используйте «Форму опроса поведения (Приложение 3-1)», чтобы ввести поведенческую историю «за 2 дня до начала» и после.

*Примеры поведенческого анамнеза в местах с повышенным риском заражения: участие в собраниях в плохо проветриваемом, закрытом помещении, в том числе на кораблях, автобусах дальнего следования, спортзалах, закрытых концертных залах, клубах, фуршетах, караоке-боксах, крытые выстав очные залы и т. д. или пребывание в эндемичных районах (внутри страны / за границей).

Дней до начала	Дата	Время	Место контакта	История поведения /контактов	Обстановка (активность, контакт с окружающими, масштаб мероприятия, наличие плохо себя чувствующих и т.д.)	Имя сопровождающ их в местах с повыш енным риском зараж ения	
Примеры записи	6/Г	9-12 13:30- 17:00 (ориентир овочно)	i) Жилой дом XX р ядом со станцией ∘о. ТЕЛ : 000-000- 0000 ii) ∆∆ город, ∆∆ префектура iii) ⋄◊ город, □□ пре фектура	легами отдела продаж , к которо му принадлежит пациент ii) Сел на автобус ∘× TouristTE Л.: 999-999-9999	 Там было около 300 зрителей, стоящих на месте. В автобусе было около 20 пассажиров, включая семью пациента (жену и 2 детей). Пассажиру стало плохо. Разговаривал без маски около 30 мину т. 	i) г-н ∘х (менеджер отде ла), г-жа □ (начальник отдела) ii) Таро ∘∘, Ханако □□, Дзиро	
14 дней до начала							
13 дней до начала							
за 12 дней до начала							
11 дней до начала							
за 10 дней до начала							
9 дней до начала							
за 8 дней до начала							
за 7 дней до начала							
за 6 дней до начала							
за 5 дней до начала							
за 4 дня до начала							
за 3 дня до начала							

^{*} Если больной уже находился под медицинским наблюдением, Анкету о поведении (источник заражения) (Приложение-2) заполнять необязательно.